

お薬の飲み合わせ表

粉薬の名前	味	水	麦茶	オレンジジュース	リンゴジュース	スポーツ飲料	アイスクリーム	プリン	ココア	ヨーグルト	嚥下補助ゼリー（苺）	その他		備考
												飲みやすい	飲みにくい	
アスペリン散	少し苦い	×	×	○	○	×	○	○	○		×	練乳、チョコ/ピーナッツクリーム	ゼリー、コーヒー牛乳	
アレロック顆粒0.5%	苦い	×	△	○	△	△								
エリスロシンドライシロップ10%	甘い	○	○	×	×	×	○	○	○		×			酸性のものと混ぜると苦くなる
オゼックス細粒小児用15%	イチゴ風味	○		×	○	×		○	○		×	苺ジャム、砂糖、ピーナッツクリーム		牛乳、アイス、練乳とは混ぜてはいけない
オセルタミビルドライシロップ	フルーツミックス風味	×		○	○	○	○		○	○				
カルボシステインドライシロップ	甘味と弱い酸味		×			×				○		牛乳、ピーチジュース	炭酸飲料	
カロナール細粒	甘味と苦み	△	×	×	×	×	○	△	△		×	苺ジャム		
クラブモックス小児用配合ドライシロップ	ストロベリークリーム味	○		○	×	△	○	○		○	△		乳酸菌飲料	
クラリスロマイシンドライシロップ	ストロベリー風味	○		×	×	×	○	○	○	×	×	砂糖、ピーナッツクリーム		
ジスロマック小児用細粒	甘い	○	○	×	×	×	○	○	○	×	△	牛乳		酸性のものと混ぜると苦くなる
シングレア細粒	無味	○					○			○				あたたかいものに混ぜてはいけない
テオフィリンドライシロップ	甘い	○		○		○	○							
ナウゼリンドライシロップ1%	甘い	△	△	×	×	×	○	○	○	×	△			
乳酸カルシウム	苦い	△	○	○	○	○	○	○	△		○			
ピオフェルミン配合散	弱い甘み	×	○	○	○	△	○	○	△	○	×			
ピオフェルミンR散	弱い甘味			○	○		○			○				
برانルカストドライシロップ	イチゴ風味	○	△	○	○	○	○	○	○		○			
フロモックス小児用細粒	甘味の後に苦味	×	○	△	△	×	○	×	○		△			
ペリアクチン散	苦い	×	×	×	×	×	×	△	○		×	乳酸菌飲料、練乳		
ミノマイシン顆粒	オレンジ風味	×	×	×	△	△	×	×	△		△	チョコ/ピーナッツクリーム	味噌汁、ポタージュ	牛乳、アイス、練乳とは混ぜてはいけない
ムコサールドライシロップ	甘い	○	△	×	×	×	○	×	○		×			
メイアクトMS細粒小児用	甘味と苦味	△	○	△	○	×	○	○	○	○	○	牛乳	飲むヨーグルト	
メジコン散	とても苦い	×	×	×	×	×	×	×	○		×			
ラックビー微粒N	弱い甘味、粉っぽい	△	△	○	○	△	○	○	○		△			
ロベミン小児用細粒0.05%	甘味と苦味	×	△	×	×	×	○	○	○	×	×	牛乳、チョコクリーム		
ワイドシリン細粒	甘い	○	×	△	○	○	○				△	苺ジャム		嚥下補助ゼリーは桃味でも変わらない

○：飲みやすい △：ふつう、変わらない ×：飲みにくい 空欄：データなし ※アイスクリームは何味でも構いません