

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 大峰薬草 便祕薬

毎日のお通じは健康のパロメーター。便秘が長引けば、体のリズムが崩れやすくなってしまいます。

大峰薬草便秘薬は、3種類の薬草（センナ、ダイオウ、オウバク）から作られた便秘薬で、便秘や、便秘に伴う症状にすぐれた効果があります。

便秘の度合いは人によって様々です。その人にあった服用量が必要になります。説明文書の用法及び用量の項目をよく読んで、ご自分の体にあった分量を服用してください。

## 《特徴》

- ・センナ、ダイオウが含有する下剤成分センノサイドA、Bは、大腸刺激性の緩下剤で、大腸を刺激して腸の運動を活発にし、便秘に効力を發揮します。
- ・オウバクの主成分ペルベリンは抗菌作用があり、便秘によって生じた腸内異常醣酵に効力を發揮します。

## △ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

### 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬（下剤）

### 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 3. 大量に服用しないこと



### 相談すること

### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

### 4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 《効能又は効果》

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔

## 《用法及び用量》

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2～5錠	1回
11歳以上15歳未満	1～4錠	
7歳以上11歳未満	1～3錠	
7歳未満	服用しないこと	

1日1回就寝前（又は空腹時）に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量してください。

## 《用法・用量に関する注意》

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 《成分及び分量》

大峰薬草便秘薬の1日量（5錠）中に含まれる成分及び分量は以下のとおりです。

センナ末 ..... 600mg  
ダイオウ末 ..... 200mg  
オウバク末 ..... 100mg  
添加物として、デヒドロ酢酸Na、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、CMC-Ca、セルロースを含有する。

本剤は生薬を用いた製品のため、錠剤の色調が多少異なることがあります。

## 《保管及び取扱い上の注意》

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574