

# *Hot Sheet Hap*

温感シートハップ。



# 腰痛

関節痛に

第3類医薬品

パップ剤と  
粘着シートが  
1体型

6枚入



↓  
切り取り線  
残りの薬が乾燥しないように、折り曲げて保管してください。

# 温感シートハッフ。

第3類医薬品



肩こり



関節痛



●はがしぐちテープ  
を取り除いて貼ってください。



お問い合わせ先  
大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口  
電話:076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

製造販売元  大協薬品工業株式会社  
富山市水橋畠等173

配置期限

ロット番号

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。

### ☏ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

### 〈用法及び用量に関する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (5)打撲、捻挫には、はれがひいてから使用してください。
- (6)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (7)本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (8)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるので、使用を控えてください。

(9)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(10)貼ったままあるいはがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがしてから入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

(11)皮膚特に弱い人は、同じ部位に続けて使用しないでください。

**成分及び分量** 膏体 100g 中

オウバク軟エキス ..... 0.33 g

(原生薬換算量) ..... 1.089 g

トウガラシエキス ..... 0.06 g

(原生薬換算量) ..... 3.0 g

d-カーフル ..... 0.2 g

l-メントール ..... 0.3 g

トコフェロール酢酸エステル ..... 0.2 g

ジフェンヒドラミン塩酸塩 ..... 0.18 g

添加物としてD-ソルビトル液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カラオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、亜硫酸水素ナトリウム、pH調整剤、ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタンを含有します。

## [保管及び取り扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

6枚入(11.8cm×7.5cm)

品目番号 追7-74-523

¥850+税

PP